

Tip 2 diyabet hastası mısınız? DPP-4* inhibitörün avantajlarıyla tanışın!

- Kan şekeri kontrolünün vücuda ait mekanizmalarını destekler
- Kan şekere bağlı olarak etki göstermesi
- Kan şekerini düşürmeye yardım eder
- Düşük hipoglisemi ihtimali
- Nötr ağırlık
- Öğünlerden bağımsız, hap olarak alınması

DPP-4-inhibitörüyle ilgili başka bilgilere ihtiyacınız var mı?

MSD Diyabet Servis Merkezi
MSD SHARP & DOHME GMBH
Lindenplatz 1
85540 Haar

Ücretsiz Danışma Hattı

0800 673 34 23

www.diabetes-behandeln.de

Yetersiz kan şekeri ayarlı
Tip 2 diyabet hastaları için



DPP-4-inhibitörü

Kan şekerini düşürmek için yeni bir yol

INR: JMT-2009-D-44548-PE


* DPP-4: Dipeptidyl-Peptidase-4



DPP-4-inhibitörü

Vücudun salgıladığı inkretin hormonu sayesinde kan şekerinin düşürülmesi

Yemek sonrası neler olur?



Uyarı: Her ilaçta olduğu gibi DPP-4-inhibitörlerinde de yan etkiler ortaya çıkabilir. İstenmeyen yan etkiler olursa lütfen sizi tedavi eden doktorunuzla görüşünüz.

Sağlıklı insanlarda

- Vücudun kendi hormonlarını, inkretinleri, salgılaması
- DPP-4 enzimleri vasıtasıyla bu inkretinlerin parçalanması
- Parçalanmayan inkretin hormonları pankreasa gelip orada etkili olurlar

Tip 2 diyabet hastalarında

- Inkretin hormonlarının azalmış olarak salgılanması
- DPP-4 bu inkretinleri parçalar
- Pankreasa çok az miktarda inkretin ulaşır

DPP-4 inhibitörlerinin Tip 2 diyabet hastalarındaki etkisi

- DPP-4-inhibitörü kan şekeri düzenlemesini sağlayan önemli 2 inkretinin hızlı parçalanmasını önler
- Pankreasta yüksek inkretin düzeyi etkili olur

Pankreas



İnsülin salgılanması artar


Sonuç

Karaciğer



Glükoz salgılanması bastırılır


Kan şekeri




Kan şekeri düzeyi azalır



Azalmış olarak insülin salgılanması



Artmış olarak glükoz salgılanması




Kan şekeri düzeyi artar



Yüksek kan şekeri değerlerinde insülin artmış biçimde serbest bırakılır



Glükoz salgılanması bastırılır



Kan şekeri düzeyi azalır